

**AUFKLÄRUNGSBOGEN**

aufcolo  
12.16

**KOLOSKOPIE: Spiegelung des Dickdarms mit Polypenabtragung, ggf mit  
Hämorrhoidensklerosierung oder Ligatur**

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient, aufgrund Ihrer Beschwerden wird eine Spiegelung des Dickdarms für nötig erachtet. Diese Untersuchung erlaubt es, das Darminnere direkt einzusehen und gegebenenfalls kleine Gewebeproben zu entnehmen. Bitte lesen Sie sich diesen Bogen aufmerksam durch und bringen Sie ihn **unterschrieben** zum Termin mit, bitte auch ein Dusch- oder Badetuch.

Wenn Sie wünschen, erhalten Sie eine "Beruhigungsspritze" zur Untersuchung. Bei der Spiegelung wird ein beweglicher Schlauch durch den After in den Enddarm eingeführt und bis zur Blinddarmregion vorgeschoben. Um die Schleimhaut besser beurteilen zu können, wird etwas Luft in den Darm geblasen, so dass krankhafte Veränderungen erkannt werden und ggf. Gewebeproben oder Polypen mittels einer kleinen Zange oder einer Elektroschlinge entnommen werden können.

**MÖGLICHE KOMPLIKATIONEN:**

Bei der Dickdarmspiegelung mit Polypabtragung sind Komplikationen selten. Die Entnahme von Gewebeproben führt, soweit keine besondere Blutungsneigung besteht, nur zu einer minimalen Blutung. Eine Verletzung (Perforation) durch das Instrument, eine Blutung, eine Infektion oder eine Überempfindlichkeitsreaktion auf die Beruhigungsspritze, Weichteil-, Nerven-, Venen-, Zahn- und Knochenläsionen, lebensbedrohliche Herz- und Kreislaufprobleme bis zur Asystolie, Unfälle auf dem Weg nach Hause kommen nur in Ausnahmefällen vor.

**VERHALTEN VOR DER UNTERSUCHUNG:**

Damit der Darm zur Untersuchung vollständig entleert ist, beachten Sie bitte das mitgegebene Blatt "Vorbereitung zur Coloskopie". Um Ihnen und uns das Ankleiden nach der Untersuchung zu erleichtern, bitten wir Sie bequeme Kleidung anzuziehen (z.B. Trainingsanzug). Asthma- und Blutdruckmedikamente bitte einnehmen, bei Insulin bitte die Dosis auf 1/3 der Einheiten reduzieren. Metformin und andere Diabetestabletten 1 Tag vor der Spiegelung weglassen.

Aspirin(ASS), Iscover, Plavix(Clopidogrel), Brilique(Ticagrelor), Efient (Prasugrel), Dipyridamol, Integrilin, bitte 1 Woche vor Termin absetzen, Pradaxa(Dabigatran), Xarelto(Rivaroxaban), Eliquis(Apixaban) Edoxaban(Lixiana) bitte zwei Tage vor Termin absetzen,

Falithrom, Coumadin, Marcumar, Phenpro min 1 Woche absetzen, Quick-Wert bestimmen lassen. Der Quickwert sollte mindestens 60 % betragen.

**VERHALTEN NACH DER UNTERSUCHUNG:**

Zwei Stunden nach der Spiegelung können Sie wieder normal essen und trinken. Falls Sie eine Beruhigungsspritze erhalten haben, dürfen Sie wegen der Beeinträchtigung des Reaktionsvermögens für 12 Stunden keine Kraftfahrzeuge und keine Maschinen (am Arbeitsplatz) bedienen. Sie müssen sich von einer Begleitperson nach Hause bringen lassen, oder benutzen Sie ein öffentliches Verkehrsmittel mit(!) Begleitung. Gegebenenfalls rufen wir Ihnen gerne ein Taxi.

Erklärung: Ich bin mit der Untersuchung einverstanden, versichere mich an die Vorgaben zu halten und habe keine weiteren Fragen. Eine Schwangerschaft oder eine Medikamentenallergie liegt nicht vor. Für Wertgegenstände aller Art, Handys, Uhren, Zahnprothesen übernehmen wir keine Haftung übergeben Sie diese Ihrer Begleitperson oder lassen Sie diese Dinge zuhause.

Datum	Unterschrift des Patienten oder des Sorgeberechtigten	Unterschrift des Arztes
-------	--	----------------------------