Internistisches Medizinisches Versorgungszentrum Pfaffenhofen
Hohenwarter Str. 31, 85276 Pfaffenhofen, Tel. 08441/81066

Informationsblatt für Patienten colvor

Vorbereitung auf die Darmspiegelung (Coloskopie) 12/16

Eine ausreichende Darmreinigung ist Voraussetzung für das Gelingen der Untersuchung. Sie liegt dann vor, wenn der Darminhalt in der Toilette völlig klar und allenfalls noch leicht gelblich gefärbt erscheint.
Bei Neigung zur Übelkeit nehmen Sie 25 Tropfen Iberogast ein.
Bei Unverträglichkeit der Lösung bitte umgehend in der Praxis melden.

Ihr Untersuchungstermin ist am:
Um Uhr

Am Vortag der Untersuchung (.....),

dürfen Sie bis ca. 8 Uhr noch ein leichtes Frühstück zu sich nehmen, danach bitte nichts mehr essen.
Dann lösen Sie 2 Eßlöffel FX-Passage SL in 1/2 l Wasser auf und trinken Sie die Lösung innerhalb 1 Stunde.
Trinken Sie bitte so viel Sie können mindestens 2 Liter Mineralwasser ohne Kohlensäure, helle Tees, klare Säfte, jedoch keine Milch, keinen Kaffee, keinen Schwarztee.

Um ca. 14.00 Uhr (Berufstätige um ca.17.00Uhr) lösen sie
5 gehäufte Esslöffel von FX-Passage SL
in mindestens 2 Liter warmen Wasser auf und trinken es im Laufe von 2-3 Stunden. Danach trinken Sie noch mindestens 1 Liter klare Flüssigkeit im Laufe von 2 Stunden.

Am Untersuchungstag (.....) lösen Sie 3 - 4 Std. vor der Untersuchung aber spätestens 06.00Uhr erneut 3 gehäufte Esslöffel FX-Passage in mindestens 1 Liter Wasser auf und trinken die Lösung innerhalb 1 Stunde, anschließend trinken Sie noch mindestens 1/2 Liter Mineralwasser, weißen Traubensaft oder Kamillentee.

Nehmen sie Ihre Tabletten (Blutdruck, Asthma) wie gewohnt ein, **Zuckertabletten** bitte **nicht** einnehmen, **Insulin max. 1/3 der Dosis** spritzen.
Aspirin(ASS),Iscover,Plavix (Clopidogrel),Brilique (Ticagrelor), Efient (Prasugrel), Dipyridamol, Integrelin bitte 1 Woche vor Termin absetzen, Pradaxa (Dabigatran), Xarelto (Rivaroxaban), Eliquis (Apixaban), Edoprabin (Lixiana) bitte zwei Tage vor Termin absetzen, Falithrom, Coumadin, Marcumar, Phenpro mindestens 1 Woche absetzen,
Quick-Wert bestimmen lassen.
Der Quick-Wert sollte mindestens 60 % betragen.
Für Wertgegenstände aller Art und Handys übernehmen wir keine Haftung.Übergeben Sie diese Ihrer Begleitperson oder lassen Sie diese Dinge zuhause.

Ihr Praxisteam