Internistisches Medizinisches Versorgungszentrum Pfaffenhofen
Hohenwarter Str. 31, 85276 Pfaffenhofen, Tel. 08441/81066

Informationsblatt für Patienten

Vorbereitung auf die Darmspiegelung (Coloskopie)
Moviprep

Eine ausreichende Darmreinigung ist Voraussetzung für das Gelingen der Untersuchung. Sie liegt dann vor, wenn der Darminhalt in der Toilette völlig klar und allenfalls noch leicht gelblich gefärbt erscheint.

Ihr Untersuchungstermin ist am:
Um Uhr

Am Vortag der Untersuchung (.....),

dürfen Sie bis ca. 8 Uhr noch ein leichtes Frühstück zu sich nehmen, danach bitte nichts mehr essen. Trinken Sie bitte so viel Sie können mindestens 2 Liter Mineralwasser ohne Kohlensäure, helle Tees, klare Säfte, jedoch keine Milch, keinen Kaffee, keinen Schwarztee.

Um ca. 14.00 Uhr (Berufstätige um ca.17.00Uhr) lösen sie 1 Btl A und 1Btl B Moviprep in 1 Liter Wasser auf und trinken es im Laufe von 2-3 Stunden. Danach trinken Sie noch mindestens 1 Liter klare Flüssigkeit im Laufe von 2 Stunden.

Am Untersuchungstag (.....) lösen Sie 3 - 4 Std. vor der Untersuchung aber spätestens 06.00Uhr erneut 1 Btl.A und 1 Btl B Moviprep in 1 Liter Wasser auf und trinken die Lösung innerhalb 1 Stunde, anschließend trinken Sie noch mindestens 1/2 Liter Mineralwasser, weißen Traubensaft oder Kamillentee.

Nehmen sie Ihre Tabletten (Blutdruck, Asthma) wie gewohnt ein, **Zuckertabletten** bitte **nicht** einnehmen, **Insulin max. 1/3 der Dosis** spritzen.
Aspirin(ASS),Iscover,Plavix (Clopidogrel),Brilique (Ticagrelor), Integrilin, Efient (Prasugrel), Dipyridamol
bitte 1 Woche vor Termin absetzen,
Pradaxa (Dabigatran), Xarelto (Rivaroxaban), Eliquis (Apixaban), Edoprabin (Lixiana) bitte zwei Tage vor Termin absetzen,
Falithrom, Coumadin, Marcumar, Phenpro
mindestens 1 Woche absetzen, Quick-Wert bestimmen lassen. Der Quick-Wert sollte mindestesn 60 % betragen.
Für Wertgegenstände aller Art und Handys übernehmen wir keine Haftung.Übergeben Sie diese Ihrer Begleitperson oder lassen Sie diese Dinge zuhause.

Ihr Praxisteam